

FORMULACIÓN: BLOQUE, PELLET Y GEL!



RATA QUILL®



En el ámbito doméstico y de salud pública las especies de roedores más importantes son: **Rata de techo** (*Rattus rattus*), **Rata de Alcantarilla** (*Rattus norvegicus*) y el **Ratón común** (*Mus musculus*). Según la Organización Mundial de la Salud Seccional Europa, los roedores transmiten al ser humano peligrosas infecciones como: *Fiebre tifoidea*, *peste bubónica*, *salmonelosis*, *leptospirosis*, *triquinosis* y *fiebre por mordedura de rata*. La presencia de roedores se da mayoritariamente en:



Cocinas



Bodegas



Tejados



Alacenas



Cañerías



Basuras

ANTES DE APLICAR

Organice y realice una limpieza general del lugar a tratar (recoja basuras, no deje desperdicios de comida, guarde los alimentos en recipientes bien tapados); Determine madrigueras, rutas de acceso y lugares de alimentación de los roedores. De esta manera, se garantizará un rápido y efectivo consumo del cebo Rataquill®.

MODO DE APLICACIÓN

Rataquill® cebo rodenticida (*Dosis Única*) en su presentación Pellets (*gránulos*), Bloque Parafinado (*Almendras*) ó Gel, puede aplicarse en cualquier momento, tan pronto como se vean señales de presencia de roedores como: heces, pelos, grasa, cables roídos, desperdicios de comida, madrigueras en áticos ó jardines. Aplique entre 10 a 50 gramos de cebo **Rataquill®** (*pellets, bloques o gel*), colocados cada 5 a 10 metros lineales, en los lugares donde se ha evidenciado tránsito, actividad y refugio de roedores.

EL CEBO DEBE COLOCARSE EN LUGARES ESTRATÉGICOS

Rata de Techo y Rata de Alcantarilla: Aplique de 10 a 50 gramos de pellets cada 5 a 10 metros lineales, ó si lo prefiere use de 2 a 3 bloques parafinados de Rataquill®. Puede colocar de 6 a 10 gramos de Rataquill® GW gel en un recipiente cebadero. Reponga el cebo consumido cada 6 días hasta que no observe consumo, lo cual indicará la eliminación de la plaga. (Ver imagen A)

Ratón casero: Aplique de 5 a 10 gramos de pellets ó si lo prefiere use 2 bloques parafinados de Rataquill® cada 3-5 metros lineales. Puede colocar 4 gramos de Rataquill® GW gel en un recipiente cebadero, solo o en mezcla con 10 g de alimento preferido. Reponga el cebo consumido cada 6 días hasta que no observe consumo.


ATENCIÓN: Notifique a los residentes sobre la aplicación del rodenticida.



Bloque Parafinado Gel Hidrosoluble


A TUBO PVC CEBADERO

Deposite al interior del tubo la dosis raticida



B TRAMPAS CEBADERAS

Ubíquelas cerca de madrigueras, corredores de tránsito



EFFECTIVO, ECONÓMICO Y AMBIENTALMENTE SEGURO