

CEBITOX®



DOCUMENTO CONTROLADO VERSIÓN WEB

FICHA TÉCNICA HORMIGUICIDA GRANULADO


Identidad del producto

Nombre comercial: Cebitox GB

Tipo de formulación: Cebo granular para uso en el control de la hormiga loca *Nulanderia fulva* (Sinónimo: *Paratrechina fulva*)

Ingrediente activo: Carbaryl
Grupo Químico: Carbamatos
No. CAS: 63 – 25 – 2

Formula estructural:



Uso Agrícola
Registro Nacional: ICA No. 2903
Titular del Registro:
Minagro Industria Química Ltda

Composición garantizada

1. Carbaryl	1.0	%
2. Inertes y materiales atrayentes	99.0	%

Descripción del producto

Cebitox GB es un cebo tóxico atrayente de proteína animal y sustancias azucaradas, específico para la hormiga loca, que al ser transportado por las forrajeras e posteriormente ingerido, elimina la colonia, por un efecto acumulativo del principio activo carbaryl, que inhibe la función de la colinesterasa afectando el sistema nervioso.

Instrucciones de uso y manejo

Cultivo	Plaga	Dosis y Aplicación
caña de azúcar, cacao, café, yuca, maíz, piña, cítricos, aguacate, guanábana, mango, cocotero, pastos, bosques, guayabo, etc.	Hormiga loca <i>Paratrechina fulva</i>	10-12 kg / hectárea Esparza finamente los gránulos húmedos sobre el suelo, en franjas distanciales 5 – 10m, libre de malezas 50 – 100 gramos/árbol Aplique alrededor de árboles atacados a una distancia del tronco igual al ancho del árbol.
Casas, jardines e instalaciones pecuarias (gallineros, galpones, porquerizas, establos).		1 – 2 gramos/m² del área tratada Esparza uniformemente el cebo en el suelo, en franjas de 1 - 2 m, alrededor y dentro de las instalaciones a tratar.

Aplicar siempre el cebo humedo, a 500g de Cebitox GB agregar lentamente 100-150 cc de agua para humedecerlo. Mezclar bien en implementos adecuados, limpios y libres de residuos químicos, hasta obtener una consistencia húmeda de pequeños gránulos. Aplicar al suelo, en franjas libres de malezas. NO PISAR EL CEBO.

Ventajas de uso

- ✓ Control eficiente y prolongado (muerte de reinas y larvas de la Hormiga Loca)
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Menor toxicidad para operarios y el medio ambiente, aprovecha los hábitos alimenticios y actividad nocturna de la hormiga.
- ✓ Biodegradable, no genera residuos tóxicos en el ambiente.
- ✓ De acción selectiva de control de la hormiga loca, no afecta la fauna benéfica.

“ Antes de utilizar el producto leer atentamente la etiqueta, hoja informativa adjunto y ficha técnica ”

Propiedades físicas y químicas

Estado Físico: Sólido en gránulos, color café claro, con olor característico.
Densidad: 0.92 g/ml a 20 °C
Inflamabilidad: No inflamable.
Solubilidad: No soluble en agua
Estabilidad: > 2 años en condiciones normales de almacenamiento dentro del empaque, evita temperaturas > 40° C.

Información Toxicológica

No ingerir, evitar el contacto con la piel, ojos y ropa

Toxicidad aguda Oral DL50: >2500 mg/kg
Toxicidad Dermal CL50: >4100 mg/kg
Toxicidad inhalatoria CL50: >20 mg/L.
Irritación en los ojos: No irritante
Irritación y sensibilización Cutánea: No irritante, no sensibiliza

Toxicidad crónica: La mezcla contiene carbaryl a una concentración ≤ 1%, según (SGA), se clasifica como No Peligroso para la salud (reproductiva, mutagenicidad, carcinogenicidad y Teratogenicidad).

No hay información sobre casos de intoxicación aguda o crónica por la exposición al producto Cebitox GB.

Categoría de riesgo 4 (SGA/OM)

Producto que normalmente no ofrece peligro

Primeros Auxilios

En caso de sospecha de una intoxicación, dejen el trabajo y buscar de inmediato asistencia médica.

Signos y síntomas de intoxicación: los carbamatos pueden causar, temblor involuntario, convulsiones, dolor de cabeza, salivación, náuseas, dolor de estómago y diarrea.

Nota para el médico: En caso de emergencia, tratar al paciente sintomáticamente con sulfato de antipina por vía (M-IV), bajo supervisión médica..

Antídoto: sulfato de antipina

Impacto ambiental

El ingrediente activo carbaryl, es tóxico para peces, organismos acuáticos, aves y artrópodos benéficos. No contamine las aguas por medio de limpieza de equipos o residuos. Este material es tóxico para abejas expuestas directamente o a residuos en el suelo. Sin embargo, no hay riesgo práctico ambiental, según el patrón de uso del producto formulado Cebitox GB y baja concentración de activo (carbaryl 1%).

Precauciones y advertencias

Mantener alejado de los niños, animales domésticos y de la granja

- ✓ No aplique el cebo cerca de las fuentes de agua y en días lluviosos. No arrojar residuos en aguas superficiales.
- ✓ Eliminar los empaques según normatividad local o retornar al distribuidor, fabricante para tal fin.
- ✓ No coger el cebo con las manos. Utilice guantes, al humedecer y aplicar el cebo, por seguridad y para no disminuir la calidad del producto.
- ✓ Aplique el cebo al suelo, en franjas limpias sin malezas, evitar pisar el producto.
- ✓ No fume, coma, ni beba durante la aplicación del producto.
- ✓ Aplicar el cebo en horas frescas del día, preferiblemente después de la 4 p.m o antes de las 7 a.m. Horas de máxima actividad de la hormiga, evitando la presencia de aves y abejas de hábitos diurnos.
- ✓ Almacenar el cebo, en sus envases originales y sellados en lugares ventilados, frescos, secos y a temperatura ambiente (<40°C).
- ✓ No almacenar o transportar con fertilizantes, pesticidas o sustancias de alta volatilidad de olor fuerte, como los derivados del petróleo.

NO VALIDO PARA LICITACIONES O CONTRATACIONES.