

VAPIREX

DOCUMENTO CONTROLADO VERSIÓN WEB

FICHA TÉCNICA VAMPIRICIDA EN POMADA


Identidad del producto

Nombre comercial: Vapirex GS

Tipo de formulación: Pomada oleosa vampiricida para el control del murciélago hematófago o vampiro.

Ingrediente activo: Brodifacouma
Grupo Químico: Derivado de las cumarinas
No. CAS: 56073-10-0

Formula estructural:



Veterinario y Salud Pública.
Licencia de Venta ICA Pecuario No. 8370-MV
Registro Sanitario No. RGSP-221-2004
Titular del Registro: Minagro Industria Química Ltda

Composición garantizada

1. Brodifacouma	0.13%
3. Inertes y materiales atrayentes	99.87%

Descripción del producto

Vapirex GS es una pomada, desarrollada exclusivamente para el control de murciélago vampiro, vector de transmisión de la rabia silvestre o rabia paralítica bovina, a los animales domésticos de sangre caliente. La pomada hace contacto con la piel del murciélago cuando este llega a morder los animales de la granja, siendo llevada por este mismo cuando regresa a la colonia, donde es lamada e ingerida por los demás vampiros, causándoles hemorragias y su muerte, reduciendo o eliminando toda la colonia.

Instrucciones de uso y manejo:

Plaga

Murciélago vampiro o de patas pelonas *Desmodus rotundus*

Dosis y aplicación

Aplice Vapirex GS Pomada, con una paletilla o espátula, así:

Aplicación en bovinos:

- ✓ Cantidad suficiente de pomada gramos/animal, para cubrir en su totalidad las partes susceptibles a ser mordidas, como orejas, la tabla del cuello, el rodete coronario, la cruz, el lomo, la cola y la ubre, etc.
- ✓ 5 gramos/mordedura, aplique alrededor de mordeduras frescas causadas por vampiros, hasta cubrir totalmente un área aproximada de 4cm a la redonda.

Recuerde: que los vampiros vuelven a alimentarse del mismo animal y de la misma herida en noches subsiguientes.

Aplicación en vampiros:

- ✓ Un gramo (1) de pomada/vampiro, aplicar sobre el dorso de los murciélagos, capturados con mallas de niebla alrededor del corral por personal capacitado, y liberarlos inmediatamente.

Ventajas de uso

- ✓ Altamente efectivo en disminuir la población de vampiros y de mordeduras frescas en los animales de la granja.
- ✓ Seguro, baja toxicidad baja para operarios y los animales.
- ✓ Económico y rendidor para aplicar en mayor número de animales.
- ✓ Fácil de aplicar sobre el ganado, no se lava con la lluvia y permanece actuando por varios días.
- ✓ Formulación de óptima calidad, no se descompone, ni pierde su eficacia

“ Antes de utilizar el producto leer atentamente la etiqueta, hoja informativa adjunto y ficha técnica ”

Propiedades físicas y químicas

Estado Físico: Pomada oleosa, color rojo heterogéneo, olor oleo.
Densidad: 0.9 g/ml a 20°C.
Inflamabilidad: No inflamable > 204°C.
Solubilidad: Insoluble en agua
Estabilidad: > 2 años en condiciones normales de almacenamiento dentro del empaque, en temperaturas (> 30° C).

Información Toxicológica

Toxicidad aguda Oral DL₅₀: 208 mg/kg de pomada en ratas (Moderadamente peligroso) Para causar la muerte a un murciélago de 4g aproximadamente, se necesita que ingiera 0.01 gramos de Vapirex GS

Toxicidad Dermal CL₅₀: >2000 mg/kg

Toxicidad inhalatoria CL₅₀: >20 mg/L.

Irritación en los ojos: Leve

Irritación y sensibilización Cutánea: Negativo

Toxicidad crónica: contiene brodifacouma 0.13% ≤ 1% de acuerdo SGA, se clasifica como no peligroso para la salud (Reproductiva, No mutagénico, No cancerígeno, No teratogénico). No hay información sobre casos de intoxicación aguda o crónica por la exposición al producto Vapirex GS.



Clase de peligro: Toxicidad Aguda Categoría 3
Toxico si se ingiere, nocivo en contacto con la piel o si se inhala

Primeros Auxilios

En caso de sospecha de una intoxicación, detener el trabajo y buscar de inmediato asistencia médica.

Signos y síntomas de intoxicación: La brodifacouma puede causar hemorragias internas y externas, aparición de moretones, sangrado de nariz y encías, sangre en la orina, hemorragias masivas, shock y coma.

Nota para el médico: Controlar el tiempo de prothrombina a las 24, 48 y 72 horas. En casos de hemorragia severa, use como antidoto vitamina K1 a dosis de 10 - 20 mg/día. Vigile los tiempos de prothrombina hasta alcanzar niveles normales.

Antídoto: Vitamina K1(Konaktion).

Impacto ambiental

El ingrediente activo brodifacouma es tóxico para mamíferos, peces y organismos acuáticos, no afecta abejas y lombriz de tierra. No hay riesgo practico ambiental para estos organismos, según el patrón de uso del producto formulado Vapirex GS, aplicado sobre los animales de la granja y baja concentración de activo brodifacouma (0,13%).

Precauciones y advertencias

Mantener alejado de los niños, animales domésticos y de la granja

- ✓ No arrojar los residuos de Vapirex GS, cerca de las fuentes de agua.
- ✓ Eliminar los empaques según normatividad local o retornarlos al distribuidor, fabricante para tal fin.
- ✓ Aplicar la pomada siempre con guantes o una paletilla o espátula, usando ropa adecuada de protección.
- ✓ Aplique la pomada (4 – 6pm), preferiblemente en días oscuros (fases lunares menguante y luna nueva), cuando el vampiro es más activo y en ausencia de lluvia.
- ✓ Los vampiros tratados con la pomada, siempre deben liberarse en horas de la noche, sin ocasionarles daño.
- ✓ No aplique otro producto veterinario de forma tópica, en los animales tratados con Vapirex GS.
- ✓ Aislar los animales tratados, no aplicar en bovinos menores de 7 meses de nacidos.
- ✓ No fume, coma, ni beba durante la aplicación del producto.
- ✓ Lavar la ropa contaminada, inmediatamente después de manipular y aplicar el producto.
- ✓ Almacenar la pomada en sus envases originales y sellados, en lugares ventilados, frescos, secos y a temperatura ambiente (<30°C).